



Underhållsbehandling i Norrköping

Charlotta Nilsson & Inger Jarlberger
Beroendekliniken Norrköping 2012-10-25



Vad står LARO för?

- Läkemedels Assisterad Rehabilitering vid Opiatberoende
- Underhållsbehandling/
Substitutionsbehandling
- Mediciner; Metadon, Buprenorfin
(Subutex, Suboxone, Buprenotex)



Syftet med behandling

- Minska dödligheten i opiatöverdos
- Ökad livskvalitet
- Social anpassning
- Drogfrihet



Vad är opiater?

- Har sitt ursprung från opiumvallmon
- Odlas i Afganistan, Pakistan, Sydostasien
- Opium, morfin, heroin samt kodein tillhör gruppen opiater, smärtstillande effekt
- 1899 lanseras heroin som ett botemedel mot morfinmissbruk



Historik Metadon

- Lanserades i New York, mitten av 60-talet av Vincent Dole, Marie Nyswander
- Startade som försök i Sverige 1966 på Ulleråker sjukhus
- Stora konflikter under flera år – förekommer även idag



Historik Buprenorfin

- Lanserades i stor skala i Frankrike 1995.
- I Sverige 1999, Subutex
- Suboxone lanserades i mitten av 2000-talet. Innehåller även det aktiva ämnet Naloxon. Detta för att förhindra injicerandet av Buprenorfin



Vad säger socialstyrelsen, SOSF 2009:27

- Dokumenterat opiatberoende under minst 1 år
- Behandling får endast ske med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), samarbete med beroendeklinik måste finnas innan insättning kan ske på annan plats
- Patienten måste vara minst 20 år



Vad säger socialstyrelsen, forts.

- Behandlingstiden ej fastställd, livslång behandling
- Individuell vårdplan ska upprättas i samband med behandlingsstart
- Inte enbart medicinering, psykosocial behandling/planering måste finnas!
- Kontraindicerat med alkohol och andra droger
- Dagliga besök första 6 månaderna



Hur arbetar vi i Norrköping?

- Utifrån SOSF 2009:27
- Medicinerar enbart med Suboxone/Metadon, Subutex vid graviditet
- Suboxone är förstahandsval
- Samverkansavtal med Norrköpings kommun
- En ansvarig specialistläkare, 5½ sjuksköterskor som jobbar i två vårdlag med patientansvar
- Bokade tider mellan 8-16 alla dagar
- Samtalskontakt via Behandlingsteamet, Norrköpings kommun



I Norrköping forts.

- Remiss från socialtjänsten
- Bedömningsmöte => ”kvalificering”
- Negativa urinprov förutom opiater/opioider
- Blodprovtagning, vikt innan medicinstart
- Upprätta individuell vårdplan i samband med medicinstart
- Uppföljning varannan månad under de första 6 månaderna, sedan var 6:e månad



I Norrköping forts.

- Övervakade urinprover minst två gånger/vecka
- Medicinintag sker övervakat
- Socialsekreterare sitter på Beroendekliniken fyra förmiddagar/vecka
- Målet är samverkan mellan alla inblandade instanser (frivård, fk, af, psykiatri, infektion etc.)
- Allt från dagligt medicinintag till eget recept



Hur ser det ut i Norrköping?

- Upptagningsområde: Östra Östergötland
- Antal patienter i behandling: 63 st patienter
- 6 st kvinnor, 57 st män
- 44 st Suboxone, 19 st Metadon
- Medelålder: 36,1 år (22 år- 63 år)
- 6 st inskrivningar 2012 som fortsatt är kvar i beh.
- Ingen kö in i behandling
- 11 st avskrivningar 2012, varav 1 st som själv valt att avsluta



Referenser

- Dole, V.P, Nyswander, M. (1965). A medical treatment for Diacetylmorphine (heroin) Addiction – A clinical trial with Methadone Hydrochloride
- Johnson, Björn (2005); Metadon på liv och död
- Kakko, J., Svanbord, K.D., Kreek, M.J., Heilig, M. (2003). 1-year retention and social function after buprenorphineassisted relapse prevention treatment for heoin depece in Sweden
- Kakko, Johan (2011); Heroinberoende
- Socialstyrelsen SOSF 2009:27
- Svensson, Bengt (2005); Heroinmissbruk